

Gebrauchsinformation

bene-Arzneimittel GmbH · Herterichstraße 1 · 81452 München · Tel.: 089 / 7 49 87 -0 · Fax: 089 / 7 49 87 -142

Thrombocid® Gel

Zusammensetzung

100 g Thrombocid® Gel enthalten:
1,5 g Natriumpentosanpolysulfat
(entsprechend 50.000 I.E. Heparin)
30 mg Rosmarinöl
30 mg Latschenkieferöl
15 mg Melissenöl franz. 73192

Anwendungsgebiete

Bei oberflächlichen Venenentzündungen und deren Folgen (Schwellungen, Wadenkrämpfe, Beingeschwüre), Stauungen, Schmerzen bzw. Schweregefühl in den Beinen, Krampfadern.

Bei Sport- und Unfallverletzungen, Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen, Verrenkungen und Blutergüssen sowie zur Nachbehandlung.

Bei entzündlichen Schwellungen sowie Sehnenscheidenentzündungen.

Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe sollte Thrombocid® Gel nicht angewendet werden.

Thrombocid® Gel sollte nicht auf offene Wunden oder Schleimhäute aufgebracht werden.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe auftreten (wie bläschenförmiger Hautausschlag und Trockenheit der Haut). In diesem Fall soll das Medikament nicht mehr angewendet werden.

Wie bei hoch- und niedermolekularen Heparinen können nach intravenöser, subkutaner oder intramuskulärer Applikation des Wirkstoffes Natriumpentosanpolysulfat dosisunabhängig sogenannte "Heparin-assoziierte Thrombozytopenien (HAT)" auftreten. Nach Anwendung von Thrombocid® Gel wurde solch eine unerwünschte Arzneimittelwirkung jedoch bisher nie beobachtet. Wir bitten dennoch um besondere Aufmerksamkeit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind nicht bekannt

Dosierung und Art der Anwendung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, mehrmals täglich Thrombocid® Gel dünn auf das erkrankte Gebiet und dessen Umgebung auftragen. Bei Beingeschwüren soll nur die Umgebung mit dem Gel eingestrichen werden.

Darreichungsformen und Packungsgrößen

Tuben zu 40 g (N1) und 100 g (N2) Gel

Anstaltspackungen mit 10 Tuben zu 100 g Gel

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften

Thrombocid® Gel enthält in besonders hoher Konzentration den Wirkstoff Natriumpentosanpolysulfat, der entzündungshemmend, abschwellend und durch Abbau und Verhinderung von Gerinnseln durchblutungsfördernd wirkt.

Die ätherischen Öle in Thrombocid® Gel haben zusätzlich krampflösende und lokal schmerzlindernde Eigenschaften.