

Gebrauchsinformation

Thrombocid® Salbe

Zusammensetzung:

100 g Thrombocid Salbe enthalten:

100 mg Natriumpentosanpolysulfat

4 mg Guajazulen

Hinweis: Enthält Parabene als Konservierungsmittel

Anwendungsgebiete:

Bei Thrombosen, Venenentzündungen, Wadenkrämpfen, Schwellungen, Beingeschwüren, Beschwerden im Zusammenhang mit Krampfadern, Hämorrhoiden, Entzündungen, Abszessen, Furunkeln, Pararittien, Blutergüssen, Prellungen, Verstauchungen, Muskelhartspann, Erfrierungen, Verbrennungen, Sonnenbrand, Insektenstichen.

Gegenanzeigen:

Bei Überempfindlichkeit gegen die in Thrombocid Salbe enthaltenen Inhaltsstoffe sollte Thrombocid Salbe nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe beobachtet worden. Wie bei hoch- und niedermolekularen Heparinen können nach intravenöser, subkutaner oder intramuskulärer Applikation des Wirkstoffes Natriumpentosanpolysulfat dosisunabhängig sogenannte "Heparin-assoziierte Thrombozytopenien (HAT)" auftreten. Nach Anwendung von Thrombocid Salbe wurde solch eine unerwünschte Arzneimittelwirkung jedoch bisher nie beobachtet. Wir bitten dennoch um besondere Aufmerksamkeit.

Dosierung und Art der Anwendung:

Ein- bis mehrmals täglich die Salbe messerrückendick auf die Haut des erkrankten Gebietes auftragen und leicht einreiben. Je nach Ausdehnung der Erkrankung 2-5 cm Salbenstrang anwenden. Bei Geschwüren die Wunde mit einem Salbenlappchen bedecken.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Tuben zu 40 (N1) g und 100 (N2) g Salbe

Anstaltspackung mit 10 Tuben zu 100 g Salbe

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel! Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften

Thrombocid Salbe wirkt entzündungshemmend und abschwellend und fördert die Durchblutung.